

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -4-7-73 546644

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

30 F.

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU-CHARENTES

CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, DEUX-SEVRES, VIENNE

12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS - Tel: (49) 41.35.55 -

ABONNEMENT ANNUEL 25F

C. C. P. LIMOGES 4.752.22.W.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
12, rue Victor Hugo - 86 - POITIERS

Nous informons nos Abonnés que notre nouveau numéro de téléphone
est le 88.35.55

BULLETIN n° 154 - Juillet 1973

[VIGNE]

MILDIOU

Les petites pluies orageuses éparses n'ont pas eu d'incidence sur l'implantation de la maladie. Les vignes arrivant à la fin floraison-début nouaison un traitement est conseillé pour maintenir la protection.

BLACK-ROT

La situation sanitaire du vignoble est satisfaisante dans l'ensemble. Toutefois il faut demeurer vigilant et renouveler le traitement si nécessaire car les pluies d'orage sont susceptibles de provoquer des contaminations.

OIDIUM

Cette maladie reste assez rare dans le vignoble normalement protégé, néanmoins il convient de poursuivre la protection des grappes soit par addition de soufre mouillable dans la bouillie, soit par un poudrage au soufre dans les parcelles très sensibles.

BOTRYTIS

Nous rappelons que le premier traitement se pratique lorsque les baies ont la grosseur d'un grain de poivre et doit être bien dirigé sur les grappes.

Produits :

Benomyl = (Benlate.....	1 Kg/ha)
Carbendazin (Bavistine ...	1 Kg/ha)
Dichlofluanide (Euparène..	4 Kg/ha)
Methylthiophanate(Pelt 44.	2 Kg/ha)

CICADELLES

Dans certains vignobles les populations de larves augmentent progressivement. Dans certains cas exceptionnels, elles dépassent le seuil d'une larve par feuille, cas où on peut effectuer un traitement.

Produits :

Azinphos	40 g MA/ha
Dimethoate	30 "
Formothion	50 "
Methidathion	30 "
Oxydéméton Méthyl	25 "

...7/120

/ POMMIERS - POIRIERS /

CARPOCAPSE

En raison des conditions climatiques favorables de ces derniers jours les éclosions sont très nombreuses et les risques de pénétration sont importants.

Afin de bien protéger les fruits, renouveler le traitement dès réception de l'avis.

TAVELURES-OLDIUM

Poursuivre la lutte si nécessaire.

/ CULTURES MARAICHÈRES /

TEIGNE du POIREAU

Les oeufs de deuxième génération ont commencé à éclore. Effectuer un traitement pour éviter les pénétrations.

Le Chef de la Circonscription
Phytosanitaire
"Poitou - Charentes"
F. BARBOTIN

Les Ingénieurs Chargés des
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
A. GRAVAUD
R. HUDE - B. MORIN

Imprimé à la Station, le 2 Juillet 73 - Précédente note : Bul. n° 153 Suppl. n° 1